

Bewijs van extra polio vaccinatie

Extra maatregelen voor bepaalde landen.

06-07-22



Dit is de omschrijving

Polio of kinderverlamming is een infectie veroorzaakt door het poliovirus. Door wereldwijde vaccinatieprogramma's is de ziekte bijna uitgeroeid en komt nog maar in enkele landen voor.

Om te voorkomen dat het virus zich weer verspreidt vanuit die landen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) extra maatregelen genomen.

- Voor landen waar WPV1, cVDPV1 of cVDPV3 voorkomt, met risico op internationale verspreiding, is vaccinatie tegen polio verplicht voor alle reizigers (van alle leeftijden) die er langer dan 4 weken verblijven. Dit vaccin moet minstens 4 weken en maximaal 12 maanden voor het verlaten van deze landen toegediend zijn. Het bewijs van toediening van het vaccin moet worden gedocumenteerd in het [Internationaal Certificaat van Inenting of Profylaxie](#) (op pagina 4 en 5, waar de verplichte vaccinaties geregistreerd worden).
 - Afghanistan (WPV1)
 - Malawi (WPV1)
 - Mozambique (WPV1)
 - Pakistan (WPV1)
 - Madagascar (cVDPV1)
 - Israël (cVDPV3)
- Voor reizigers die langer dan 4 weken verblijven in een land waar cVDPV2 voorkomt, met risico op internationale verspreiding, is deze extra vaccinatie aanbevolen, maar niet verplicht. Dit geldt voor de volgende landen:
 - Benin
 - Burkina Faso
 - Cameroon
 - Centraal Afrikaanse Republiek
 - Congo (Brazaville)
 - Democratische Republiek Congo
 - Djibouti
 - Egypte
 - Ethiopië
 - Gambia
 - Ghana
 - Guinée (Conakry)
 - Guinée (Bissau)
 - Jemen
 - Liberia
 - Mauritanië
 - Niger
 - Nigeria

- Oeganda
- Oekraïne
- Senegal
- Sierra Leone
- Somalië
- Tadzjikistan
- Togo
- Tsjaad
- Zuid-Soedan

Mogelijke vaccins tegen polio

- Imovax® Polio
- Revaxis®
- Boostrix-Polio®
- Tetravac®
- Infanrix-IPV®
- Hexyon®
- Infanrix-Hexa®

Links

- [Internationaal Certificaat van Inenting of Profylaxie](#)
- [Polioeradication.org](#)