

## Vaccination contre le méningocoque ACW<sub>135</sub>Y

Ceinture de méningite	La vaccination est recommandée aux voyageurs qui résident dans la <b><u>ceinture de méningite</u></b> pendant la <b>saison sèche</b> (entre fin décembre et fin juin) et qui soit: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vont avoir des contacts étroits avec la population locale (par exemple, visites familiales, travail médical, etc.);</li><li>• y restent pendant quatre semaines ou plus;</li><li>• n'ont pas de rate ou ont une rate qui fonctionne mal (par exemple, en cas de drépanocytose);</li><li>• souffrent de certaines formes <b><u>d'immunosuppression</u></b>.</li></ul>
Une épidémie	La vaccination est recommandée si vous voyagez dans une région où il y a une épidémie de méningite.
Pèlerinage à la <b><u>Mecque</u></b>	La vaccination est obligatoire pour toute personne à partir de 2 ans qui se rend en pèlerinage à la Mecque.
Étudiants	Dans certains pays (par exemple, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique), une preuve de vaccination contre un ACW <sub>135</sub> Y est requis aux étudiants étrangers.

### 1. Vaccin contre les méningococciques.

En Belgique, le vaccin conjugué contre le méningocoque C'est proposé gratuitement **dans le calendrier vaccinal de base**. Ce vaccin ne protège pas contre les autres méningococciques. Il peut être remplacé par le vaccin conjugué contre le méningocoque ACW<sub>135</sub>Y, mais celui-ci n'est pas gratuit.

Dans certains pays (comme les Pays-Bas), la vaccination contre le méningocoque ACW<sub>135</sub>Y est un vaccin de base. La vaccination contre le méningocoque B n'est pas un vaccin standard en Belgique.

Il n'y a plus de vaccin non conjugué contre le méningocoque ACW<sub>135</sub>Y disponible en Belgique.

Il existe deux vaccins conjugués contre le méningocoque ACW<sub>135</sub>Y sur le marché en Belgique, Menveo® et Nimenrix®. Ces vaccins sont interchangeables.

## Indications pour la vaccination contre les méningococciques ACW<sub>135</sub>Y chez les voyageurs

### 2. Schéma des vaccinations

## 2.1 Adultes et enfants de plus de 2 ans

- Le vaccin conjugué contre le méningocoque ACW135Y (Nimenrix® ou Menveo®) consiste en une injection. Dans certaines formes **d'immunosuppression**, deux doses sont recommandées.
- Boosters: la protection dure au moins 5 ans. Pour l'instant, une vaccination de rappel est recommandée après 5 ans en cas d'exposition continue.
- Pour les personnes à partir de 12 ans qui ont été vaccinées avec Nimenrix®, la durée de protection est d'au moins 10 ans.

## 2.2 Calendrier de vaccination pour les jeunes enfants

Menveo® est enregistré pour utilisation à partir de l'âge de 2 ans.

Nimenrix® est enregistré pour utilisation à partir de l'âge de 6 semaines.

Âge	
6 semaines - 6 mois	2 doses à intervalles de 2 mois
Plus de 6 mois	1 dose

**Rappels:** les nourrissons qui ont reçu leur primovaccination entre l'âge de 6 semaines et 12 mois doivent recevoir une dose de rappel à l'âge de 12 mois, à au moins 2 mois d'intervalle de la dernière vaccination avec Nimenrix®.

## 3. Administration du certificat de vaccination pour les pèlerins de la Mecque

Les personnes qui demandent un visa pour un pèlerinage à la Mecque (Hajj ou Umrah) doivent présenter une preuve de vaccination contre le méningocoque ACW135Y, qui doit répondre aux conditions suivantes:

- Le vaccin doit avoir été administré au moins 10 jours avant le départ.
- Le certificat de vaccination est généralement valable pendant 3 ans.
- Si un vaccin conjugué contre le méningocoque ACW135Y est administré, le certificat est **valable pendant 5 ans** à condition que le médecin note explicitement qu'il s'agit d'un vaccin conjugué et que le nom du vaccin soit noté.
- En théorie, l'utilisation **Certificat international de vaccination et de prophylaxie** n'est pas obligé, mais la pratique montre que c'est souvent demandé par le consulat.

## 4. Liens utiles

- [Avis du CSS sur l'immunosuppression](#)
- [Conseils du CSS sur les vaccinations contre les méningococciques](#)
- [Fiche Matra sur les infections invasives à méningocoques](#)

## 5. Références

- [Conseils sur l'immunosuppression HHR](#)
- [Notices de](#) Nimenrix et Menveo