

Meningokokken ACW135Y-vaccinatie

Meningitis-gordel	Vaccinatie is geadviseerd bij reizigers die verblijven in de <u>meningitisgordel</u> tijdens het droge seizoen (tussen eind december en eind juni) en die ofwel: <ul style="list-style-type: none">• er nauw contact hebben met de plaatselijke bevolking (bv. familiebezoek, medisch werk ...),• er vier weken of langer verblijven,• geen of een slecht functionerende milt hebben (bv. sikkelcelanemie);• lijden aan bepaalde vormen van <u>immuunsuppressie</u>.
Pelgrimstocht naar Mekka	Vaccinatie is verplicht voor iedereen vanaf twee jaar oud die op bedevaart naar Mekka gaat.
Studenten	In sommige landen (zoals Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika) wordt een bewijs van vaccinatie tegen meningokokken ACW135Y gevraagd aan buitenlandse studenten.

1. Meningokokken vaccins

In België wordt het geconjungeerd meningokokken C-vaccin gratis aangeboden in het **basisvaccinatieschema**. Dit vaccin biedt geen bescherming tegen de andere meningococci. Het kan vervangen worden door een geconjungeerd combinatievaccin tegen meningokokken ACW135Y, maar dit is niet gratis.

In sommige landen (zoals Nederland) wordt vaccinatie tegen meningokokken ACW135Y wel standaard aangeboden. Vaccinatie tegen meningokokken B is geen standaardvaccin in België.

Er is geen niet-geconjungeerde vaccin tegen meningokokken ACW135Y beschikbaar in België.

Er zijn twee geconjungeerde vaccins tegen meningokokken ACW135Y op de markt in België, namelijk Menveo® en Nimenrix®. Deze vaccins zijn verwisselbaar.

Indicaties voor vaccinatie tegen meningokokken ACW135Y bij de reiziger

2. Vaccinatieschema

2.1 Volwassene en kinderen vanaf twee jaar:

- Het geconjungeerde meningokokken ACW135Y-vaccin (Nimenrix® of Menveo®) bestaat uit één injectie. Bij sommige vormen van **immuunsuppressie** zijn twee dosissen aanbevolen).
- Boosters: het is nog onduidelijk hoe lang de bescherming aanhoudt, maar minimaal vijf jaar. Voorlopig raadt men boostervaccinatie aan na vijf jaar bij blijvende blootstelling.

2.2 Vaccinatieschema jongere kinderen:

Menveo® is geregistreerd voor gebruik vanaf de leeftijd van twee jaar.

Nimenrix® is geregistreerd voor gebruik vanaf de leeftijd van zes weken.

Leeftijd	
6 weken – 6 maanden	Twee dosissen met interval van Twee maanden
Ouder dan 6 maanden	1 dosis

Boosters: zuigelingen die hun primaire immunisatiekuur hebben gekregen op de leeftijd van zes weken tot twaalf maanden, moeten op de leeftijd van twaalf maanden een boosterdosering krijgen, met een interval van tenminste twee maanden na de laatste vaccinatie met Nimenrix®.

3. Administratie in het kader van het vaccinatiebewijs bij pelgrims naar Mekka

Mensen die een visum aanvragen voor een bedevaart naar Mekka (Hajj of Umrah), moeten verplicht een vaccinatiebewijs tegen meningokokken ACW135Y kunnen voorleggen, dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen:

- Het vaccin moet minimaal tien dagen voor vertrek toegediend zijn.
- Het vaccinatiebewijs is doorgaans drie jaar geldig.
- Wanneer een geconjungeerd vaccin tegen meningokokken ACW135Y wordt toegediend, is het bewijs vijf jaar geldig op voorwaarde dat de arts expliciet noteert dat het een geconjungeerd vaccin is en daarbij ook de productnaam noteert.
- In theorie moet het niet in het **International certificate for vaccination and prophylaxis** genoteerd worden, maar de praktijk wijst uit dat dit echter vaak wel wordt gevraagd door het consulaat.

4. Nuttige links

- [Advies immuunsuppressie HGR](#)
- [Advies meningokokkenvaccinatie HGR](#)
- [Richtlijn meningokokken invasieve infectie Zorg en Gezondheid](#)

5. Referenties

- [Advies immuunsuppressie HGR](#)
[Productinformatiefiches](#) Nimenrix en Menveo