

# Vaccin supplémentaire contre polio

## Des mesures supplémentaires pour certains pays.

06-07-22



Dit is de omschrijving

Le polio est une infection causée par un virus. Grâce aux campagnes de vaccination mondiales, la maladie est presque éradiquée, à l'exception de quelques pays.

Afin de prévenir l'exportation du virus à partir de ces pays, l'Organisation Mondiale de la Santé (l'OMS) a imposé des mesures supplémentaires.

- Tous les voyageurs (de tous les âges) qui résideront plus de 4 semaines dans les pays où existent les types WPV1, cVDPV1 ou cVDP3, avec risque de diffusion internationale, devront être vaccinés contre le polio. Ce vaccin doit être administré au moins 4 semaines et maximum 12 mois avant de quitter un de ces pays. L'administration du vaccin doit être documentée dans le « [Certificat International de Vaccination ou de Prophylaxie](#) », appelé 'le carnet jaune' (sur page 4 et 5, où les vaccinations obligatoires sont documentées)
  - Afghanistan (WPV1)
  - Malawi (WPV1)
  - Mozambique (WPV1)
  - Pakistan (WPV1)
  - Madagascar (cVDPV1)
  - Israël (cVDPV3)
- Pour les voyageurs qui résideront plus de 4 semaines dans un pays où existe cVDPV2, avec risque de diffusion internationale, cette vaccination est recommandée mais pas obligatoire. Ceci concerne les pays suivants:
  - Bénin
  - Burkina Faso
  - Cameroun
  - Chad
  - République centrafricaine
  - Congo (Brazaville)
  - République démocratique du Congo
  - Djibouti
  - Égypte
  - Éthiopie
  - Gambie
  - Ghana
  - Guinée (Conakry)
  - Guinée (Bissau)
  - Liberia
  - Mauritanie
  - Niger
  - Nigeria
  - Ouganda
  - Sénégal

- Sierra Leone
- Somalie
- Sud-Soudan
- Tadjikistan
- Togo
- Ukraine
- Yémen

## Vaccins possibles

- Imovax® Polio
- Revaxis®
- Boostrix-Polio®
- Tetravac®
- Infanrix-IPV®
- Hexyon®
- Infanrix-Hexa®

## Liens

- [Certificat International de Vaccination ou de Prophylaxie](#)
- [Polioeradication.org](#)